

# pourfemme SALUTE

Google Ricerca personalizzata

Cerca

Pourfemme Moda Bellezza **Salute** Dieta Coppia Gossip Mamma Matrimonio Tempo Libero Ricette Oroscopo


Scrivi una notizia | Segnala una notizia

Registrati | Login | Connect

## Scoliosi: riduce il rischio di anoressia e bulimia

Publicato da Cinzietta in Anoressia, Bulimia, In Evidenza, Malattie, Ricerca Medica.

Sabato, 30 Aprile 2011.



La **scoliosi** riduce il rischio di **anoressia** e **bulimia**? Pare proprio di sì, almeno secondo l'ultima ricerca condotta dall'**Isico (Istituto scientifico Italiano Colonna Vertebrale)**. Anche se l'abbinamento delle due cose può sembrarci atipico, così non è. Al contrario la letteratura scientifica ha da tempo abbinato le due **malattie**, sottolineando però il contrario: ovvero che la scoliosi potrebbe determinare un aumento dell'incidenza dei **disturbi del comportamento alimentare**. Lo studio italiano si pone dunque in controtendenza.

### Primo Piano



Incontinenza: colpisce oltre 3 mln di donne



Cellule staminali embrionali umane: gli scienziati europei sono preoccupati



Cellulite: NO alle sigarette e all'alcol

### In Evidenza



Terme di Comano: le cure naturali per i problemi della pelle



Scoliosi: riduce il rischio di anoressia e bulimia



Gambe pesanti e stanche: i rimedi naturali

Vedi tutti

### Benessere & Estetica

- Alimentazione
- Cellulite
- Chirurgia Plastica
- Depilazione / Epilazione
- Dieta
- Fitness
- Integratori
- Massaggio
- Spa e Centro Benessere
- Viaggi Benessere

Feed per categoria

### Gravidanza E Maternità

- Allattamento
- Concepimento
- Contracezione
- Fertilità
- Ginecologia
- Gravidanza
- Menopausa
- Mestruazioni
- Ovulazione
- Parto
- Pediatria
- Sterilità

### Mente

- Depressione
- Psicologia
- Stress

### Salute E Prevenzione

- Anoressia
- Bulimia
- Colesterolo
- Cura Dei Denti
- Diabete
- Farmaci
- Malattie
- Medicine Alternative
- News Mediche
- Obesità
- Omeopatia

Ma vediamo come si è giunti a tali conclusioni. I ricercatori **del Isico** hanno coinvolto 187 ragazze di circa 15 anni in **terapia per scoliosi idiopatica** con corsetto ed esercizi e le hanno confrontate con 93 coetanee senza scoliosi. Spiega Fabio Zaina, uno degli specialisti **del Isico**: *"fino a questo momento si è sempre creduto che ci fosse una percentuale maggiore di **disordini alimentari (anoressia e bulimia) fra adolescenti con scoliosi idiopatica. Non a caso un recente studio realizzato a Roma presentava percentuali del 9,2% per l'anoressia e del 7,7% per la bulimia tra le giovani pazienti affette da questa patologia della colonna vertebrale. In realtà se possiamo associare alla scoliosi un indice di massa corporea più basso, probabilmente legata a differenze ormonali, per il resto noi abbiamo raccolto dati diversi. Abbiamo riscontrato una percentuale dell'1,6%, di disordini alimentari utilizzando un questionario di screening, l'Eat 26, fra i più accreditati per questo tipo di analisi"***.

Nel concreto, questa nuova ricerca insinua forti dubbi sulla connessione tra scoliosi e **disordini alimentari**, anzi, nei pazienti in **terapia**, addirittura il dato si inverte e diventa più basso di quello che è il tasso generale di **anoressia e bulimia** tra la popolazione totale. I risultati di questo lavoro dal titolo "Scoliosis in adolescents reduces the risk of eating disorders" verrà presentato il prossimo 19 maggio nel corso dell'VIII Congresso Annuale di SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

Via | [Isico](#)

Condividi - Stampa - Commenti (0) (0 Voti, media: 0 di 5)

Tag: Disturbi Alimentari

Articoli Correlati

- Anoressia: più a rischio chi è nato in primavera**  
29 Aprile 2011
- Disturbi alimentari: a rischio le adolescenti che passano ore su Facebook**  
19 Marzo 2011
- Anoressia: per la settimana della moda di Milano arrivano le sentinelle**  
22 Febbraio 2011
- Milano Food is Fashion: quando la moda abbraccia la sana alimentazione**  
19 Febbraio 2011
- Ortoressia, il disturbo dell'alimentazione legato ai cibi sani**  
16 Febbraio 2011
- Anoressia: dipenderebbe da un disturbo del cervello**  
9 Febbraio 2011

Aggiungi il tuo commento

Registrati nella community di Salute Pour Femme per accedere a tutti i blogs di Nanopress con un unico nickname e avatar. Inoltre potrai segnalare

- Siti Utili
- News Salute
- Archivi
- Aprile 2011
  - Marzo 2011
  - Febbraio 2011
  - Gennaio 2011
  - Dicembre 2010
  - Novembre 2010
  - Ottobre 2010
  - Settembre 2010
  - Agosto 2010
  - Luglio 2010
  - Giugno 2010
  - Maggio 2010
  - Aprile 2010
  - Marzo 2010
  - Febbraio 2010
  - Gennaio 2010
  - Dicembre 2009
  - Novembre 2009
  - Ottobre 2009
  - Settembre 2009
  - Agosto 2009
  - Luglio 2009